

## 艾思瑞<sup>®</sup>简明处方

【通用名称】艾思瑞<sup>®</sup>

【通用名称】吡非尼酮胶囊

【适应症】用于轻、中度特发性肺间质纤维化

【包装】药用塑料瓶，54粒/瓶

【生产企业】北京康蒂尼药业股份有限公司

【用法用量】

本品的初始用量为每次200mg，每日3次，希望能在两周的时间内，通过每次增加200mg剂量，最后将本品用量维持在每次600mg（每日1800mg）；对无法耐受本品不良反应的患者，可以初始剂量100mg开始，每周增加100mg直至第六周的每次600mg维持剂量，或者延长低剂量服用时间。

【不良反应】

恶心、呕吐、消化不良等胃肠道反应，光过敏等皮肤反应，多为轻中度，并为可逆反应。

【禁忌】

对本品任何成份过敏的患者禁用；

重度肝病患者禁用；

妊娠及哺乳期患者禁用；

患有严重的肾病或需透析治疗者禁用；

需同时服用氟伏沙明者（一种治疗抑郁症或强迫性精神障碍的药物）

【注意事项】

应用本品会发生嗜睡、头晕等相关情况，因此使用本药的患者不要驾车或从事危险的机器操作。若患者在服药期间不得不参加某些依赖反应力、动作协调能力而完成的运动，则需特别注意其影响。

1、在本品的临床试验中仅发现本品可以改善轻中度特发性肺间质纤维化患者的肺功能指标，尚未发现本品可以逆转肺纤维化。

2、慎用（以下患者慎重使用）

(1)肝功能受损的患者，应用本品可能会进一步损害肝功能或者使之恶化，轻度或中度肝功能不全患者慎用；重度肝病患者禁用；肝病患者在使用本品前及使用过程中均应定期检查肝功能。

(2)尚缺少肾功能受损的患者使用本品数据，患有严重的肾病或需透析治疗者禁用。